

WAT IS HET EFFECT VAN DE OMSCHAKELING VAN EEN FORMULE OP BASIS VAN INTACTE EIWITTEN NAAR EEN PEPTIDE VOEDING?

Kinderen met een vertraagde ontwikkeling hebben vaak last van orale motor dysfunctie waardoor zij afhankelijk zijn van enterale voedingen.²⁻⁴ Hoewel deze voedingen vaak een verbeterde nutritionele status geven aan de kinderen, komen intoleranties tegen deze enterale voedingen veel voor in deze doelgroep.^{5,6} Het identificeren van de juiste voedingsinterventie, om deze intoleranties te voorkomen, is cruciaal om de groei en ontwikkeling van deze kinderen te waarborgen.

Methoden


Retrospectieve studie waarin 13 kinderen (leeftijd: 8,4 jaar $\pm$ 4,6 jaar) werden onderzocht die:

1. een significante ontwikkelingsachterstand hadden
2. $\geq 90\%$ van hun energie behoeften via een gastrotube kregen
3. hun huidige voeding, op basis van intacte eiwitten, niet goed verdroegen
4. switchten naar de peptide voedingen van Peptamen® Junior.

Deze studie werd uitgevoerd in Durham, North Carolina, USA.*

Resultaten

Symptomen van intolerantie voor en na de switch naar Peptamen® Junior voedingen (n = 13)



92%

12 van de 13 kinderen lieten een verbeterde tolerantie zien

75%

van de kinderen had al 1 week na de switch verbetering van de klachten

82%

van de kinderen kon het gebruik van medicatie stoppen ofwel aanzienlijk verminderen

Conclusie

De omschakeling naar Peptamen® Junior voedingen verbeterde de symptomen van voedingsintolerantie in vrijwel alle kinderen met een vertraagde ontwikkeling.

PEPTAMEN®
Junior



*De producten gebruikt in dit onderzoek zijn beschikbaar op de markt in de Verenigde Staten en zijn qua samenstelling vergelijkbaar aan de Peptamen Junior (Advance) (n=12) en de Peptamen Junior PHGG (n = 1).

Refs: 1. Minor et al. *Global Pediatric Health*. 2016;3:1-6. • 2. Sullivan et al. *Dev Med Child Neurol*. 2005;47:77-85. • 3. Sullivan et al. *Dev Med Child Neurol*. 2000;42:674-680. • 4. Savage et al. *JPEN*. 2012;36(suppl1):118S-123S. •

5. Chong et al. *Curr Opin Pediatr*. 2001;13:441-44. • 6. Marchand et al. Burlington, MA: Bartlett; 2007.

Deze informatie is uitsluitend voorbehouden aan zorgprofessionals. Voeding voor medisch gebruik, gebruiken onder medisch toezicht.